

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Мегалит», к.т.н.

О.В. Хомяченко

2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ

Средства для ухода за животными, обработка вымени после доения на основе молочной кислоты «Postmilk Lactic» серии «CLEANOL AGRO».

РАЗРАБОТАНО:

Инженер-технолог отдела разработок

ООО «Мегалит»

Рыскова Е.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Ryiskova", written over a horizontal line.

Москва 2017

ИНСТРУКЦИЯ

Средства для ухода за животными, обработка вымени после доения на основе молочной кислоты «Postmilk Lactic» серии «CLEANOL AGRO».

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средства для ухода за животными, обработка вымени после доения на основе молочной кислоты «Postmilk Lactic» серии «CLEANOL AGRO»; ТУ 20.41.32-030-70173104-2017; № сертификата соответствия: № РОСС RU. АД.83. Н01710 срок действия с 07.12.2017 по 06.12.2020. Производитель: ООО «Мегалит», Московская область. г. Серпухов, Ивановские дворики, филиал № 2.

2. Назначение

Препарат «Postmilk Lactic» является готовым к употреблению средством для ухода за сосками вымени коров после каждой процедуры доения. Принцип действия молочной кислоты основывается на снижении рН поверхности вымени, что при совместном действии со смесью изотиазолинов обеспечивает длительную защиту от аэробных, анаэробных бактерий и микромицетов. При местном применении в системный кровоток препарат не абсорбируется, системного действия не оказывает.

3. Области применения

Препарат применяют для обработки кожи вымени коров после доения с целью профилактики маститов.

4. Инструкция по применению

Сразу же после снятия доильного аппарата с вымени по окончании доения кожу сосков вымени обрабатывают препаратом путем обмакивания в чашку для дезинфекции. При нанесении препарата необходимо обработать не менее $\frac{3}{4}$ поверхности соска вымени. Для обработки можно использовать любой вид стакана для обмакивания сосков молочной железы. Регулярно, не менее одного раза в неделю, чашки для дезинфекции необходимо мыть в теплой воде. Защитная пленка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением с помощью воды и салфетки.

5. Безопасность

Препарат не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических реакций. Противопоказания к применению препарата не установлены. Препарат не рекомендуется применять совместно с другими препаратами. Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать без ограничений. При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности. В случае контакта препарата со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо сразу же промыть пораженный участок большим количеством воды, а при проглатывании – запить большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Самостоятельно рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу. В случае возникновения

осложнений после применения препарата, его использование прекращают и сообщают об этом производителю.

6. Хранение

Хранить при температуре от 0°C до +30°C в оригинальной упаковке от производителя. Допускается заморозка во время транспортировки. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Срок годности – 1 год от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Жидкость непрозрачная гелеобразная масса малинового цвета.
- pH – 2,90-3,50;
- Плотность при 20°C не менее 1025-1030 г/см³;
- Массовая доля молочной кислоты – 0,7% (7000 ppm)

8. Состав

Вода, глицерин, сорбитол, молочная кислота, пленкообразующий компонент, краситель, аллантоин, Д-пантенол, смесь изотиазолинов, отдушка.

9. Данные по экологии

Средство полностью биоразлагаемо.

10. Форма фасовки продукции:

5 л тара - 5 кг.

10 л тара – 10 кг.

20 л тара - 20 кг.

220 л бочка -220 кг.

1000 л куб - 1000 кг.