# ГЕНТАМОКС (GENTAMOX)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ГЕНТАМОКСА для лечения бактериальных инфекций у свиней и крупного рогатого скота
(организация - разработчик фирма « Laboratorios Hipra, S.A.», Испания).

## I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ГЕНТАМОКС (GENTAMOX).
Международное непатентованное наименование: амоксициллина тригидрат и гентамицина сульфат.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
ГЕНТАМОКС в 1 мл в качестве действующих веществ содержит 150 мг амоксициллина в форме тригидрата и 40 мг гентамицина в форме сульфата.
По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию светло-желтого цвета.
3. ГЕНТАМОКС выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянныефлаконы, укупоренные резиновыми пробками, укреплёнными алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы в индивидуальные картонные коробки.
4. ГЕНТАМОКС хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5ºС до 25ºС.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.
Запрещается использовать ГЕНТАМОКС по истечении срока годности.
5. ГЕНТАМОКС следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

## II. Фармакологические свойства

7. ГЕНТАМОКС – комбинированный антибактериальный лекарственный препарат.
Комбинация амоксициллина и гентамицина обладает широким антибактериальным спектром, включающим грамположительные микроорга-низмы (в том числе Streptococcus spp., Staphylococcus spp., и Corynebacterium) и грамотрицательные микроорганизмы (в том числе Escherichia coli, Pasteurella spp., Salmonella spp. и Pseudomonas spp.).
Амоксициллин и гентамицин хорошо всасываются из места инъекции и проникают в большинство органов и тканей организма животного. Максимальная концентрация амоксициллина достигается через 1 час после инъекции и гентамицина через 30 минут. Терапевтические концентрации сохраняются в течение 24 часов. Выводятся антибиотики из организма животного преимущественно с мочой.
ГЕНТАМОКС по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

8. ГЕНТАМОКС с лечебной целью применяют свиньям при колибактериозе, метрите, мастите, бронхопневмонии и энтерите бактериальной этиологии, крупному рогатому скоту при мастите, метрите, бронхопневмонии и энтерите бактериальной этиологии.
9. Противопоказанием к применению препарата является беременность, заболевания почек, а также повышенная индивидуальная чувствительность животных к пенициллинам и аминогликозидам.
10. ГЕНТАМОКС вводят внутримышечно один раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг массы животного в течение 3 суток.
Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают. При больших объемах введения ГЕНТАМОКСА рекомендуется инъекцию проводить в несколько мест для улучшения всасывания лекарственного препарата.
11. При передозировке у животных на месте инъекции возможно развитие отека, который рассасывается самопроизвольно в течение 1-2 суток.
12. Особенностей действия при первом введении препарата и при его отмене не выявлено.
13. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата следует немедленно возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.
14. Побочных явлений и осложнений при применении ГЕНТАМОКСА в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакции животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.
15. ГЕНТАМОКС не следует применять вместе с бактериостатическими антибиотиками.
16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 30 суток после последнего введения ГЕНТАМОКСА. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.
Молоко можно использовать для пищевых целей не ранее, чем через минимум 3 суток после последнего применения лекарственного препарата. Молоко, полученное до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

## IV. Меры личной профилактики

17. При работе с ГЕНТАМОКСОМ необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель фирма «Laboratorios Hipra, S.A.»; Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.
Адрес места производства: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Инструкция разработана фирмой «Laboratorios Hipra, S.A.» (Испания).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения: 724-3-12.12-0809 № ПВИ-3-7.6/02018

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению ГЕНТАМОКСА для лечения бактериалъных инфекций свиней и крупного рогатого скота, утвержденная Россельхознадзором 29.12.2006 г

© HIPRA - All rights reserved

**LABORATORIOS HIPRA, S.A.** Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain
Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com