



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
129329, Россия, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-10.26-5343 N ПВР-3-10.26/04195

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия (Delcid 7,5 suspension);

международные непатентованные наименования действующих веществ – дельтаметрин, дифлубензурон, пиперонилбутоксид.

2. Лекарственная форма: суспензия для наружного применения.

ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: дельтаметрин – 7,5 мг, дифлубензурон – 3 мг и пиперонилбутоксид – 1,5 мг, а также вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуен (БХТ), сорбитол, глицерин, полиэтиленгликоль-400 и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию от белого до кремового с розовым или желтым оттенком цвета.

При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя составляет 3 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 8 месяцев. Запрещается применять по истечении срока годности.

4. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия выпускают расфасованным по 75, 200 и 500 мл в полимерные флаконы; по 1 л в полимерные бутылки; по 2,5 и 5,0 л в полимерные канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы по 75 мл помещают поштучно в картонные пачки (потребительская упаковка). Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 25°C.

6. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия относится к фармакотерапевтической группе: инсектоакарицидные средства в комбинациях.

10. Входящий в состав препарата дельтаметрин ((1R)-цис-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-α-цианбензиловый эфир) – синтетический пиретроид, обладает выраженным инсектоакарицидным и репеллентным действием, активен в отношении саркоптоидных клещей (*Psoroptes*, *Chorioptes*, *Sarcoptes*), иксодовых (*Boophilus*, *Demacentor*, *Haemaphysalis*, *Hyalomma*, *Ixodes*, *Rhipicephalus*); кровососущих насекомых, включая слепней (*Pangonius*, *Nanorhynchus*, *Heptatoma*, *Tabanus*, *Hybomitra*, *Atylotus*, *Phillipomya*, *Dasyrhamphus*, *Theriopectus*, *Chrysops*, *Haematopota*, *Silvius*), оводов (*Hypoderma*, *Oedemagena*, *Oestrus*, *Rhinoestrus*, *Cephenomia*, *Cephalopina*, *Gastrophilus*), комаров (*Aedes*, *Culex*, *Culiseta*, *Anopheles*, *Mansonia*, *Uranotaenia*, *Orthopodomyia*), мошек (*Simuliidae*), мокрецов (*Culicoides*, *Leptocnops*, *Lasiohelea*), вшей (*Haematopinidae*, *Linognathidae*, *Holopuridae*), кровососок (*Melophagus ovinus*) и зоофильных мух (*Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca domestica*, *Fannia canicularis*, *Musca stabulans*, *Musca autumnalis*, *Musca larvipara*, *Musca amica*, *Wohlfahrtia magnifica*, *Stomoxys calcitrans*, *Lyperosia titilans*, *Lyperosia irritans*).

Механизм действия дельтаметрина основан на блокировании нервно-мышечной передачи нервных импульсов на уровне периферических нервных узлов, что приводит к неконтролируемой активности центральной нервной системы и гибели эктопаразитов.

Дифлубензурон (3-(2,6-дифторбензоил)-1-(4-хлорфенил)-мочевина) – соединение группы ингибиторов хитина нарушает гормональные процессы, обеспечивающие синтез хитина в организме личинок членистоногих, что нарушает процесс линьки, вызывая образование уродливых нежизнеспособных форм, прекращение яйцекладки, выводимости личинок из яиц и пополнение популяции.

Пиперонилбутоксид (5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол) является синергистом пиретроидов, блокирует активность ферментов монооксигеназ и карбоксиэстераз эктопаразитов, участвующих в детоксикации инсектоакарицидов, улучшая проникновение пиретроида через кутикулу, усиливает его влияние на нервную систему насекомого, ускоряет наступление паралича.

После кожного нанесения лекарственного препарата входящие в его состав активные вещества равномерно распределяются по поверхности, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосных луковицах и сальных железах животного, оказывают длительное контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие.

ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия активен в отношении личиночных и имагинальных фаз развития эктопаразитов, в том числе устойчивых к другим инсектоака-

рицидам, вызывает прекращение яйцекладки и/или нарушение выводимости личинок, образование уродливых нежизнеспособных особей и пополнение популяции эктопаразитов.

Применение препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия снижает риск заражения животных трансмиссивными заболеваниями, переносчиками которых являются клещи и насекомые, в том числе бабезиозом, анаплазмозом, тейлериозом, сибирской язвой, туляриемией, ящуром, туберкулезом, бруцеллезом, сетариозом, моракселлезом, блютангом, заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота, вольфартиозом и онхоцеркозом. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия после накожного нанесения вызывает гибель эктопаразитов до передачи животному возбудителя заболевания.

ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007 при внутрижелудочном введении относится к 3 классу опасности – «вещества умеренно опасные», при накожном нанесении к 4 классу опасности – «вещества малоопасные». В рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим действием на кожу, при попадании в глаза вызывает слабо выраженное раздражение слизистых оболочек. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия применяют для обработки крупного рогатого скота в целях уничтожения эктопаразитов и защиты животных от их нападения.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не следует наносить ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия на влажную, поврежденную и загрязненную кожу животного.

13. При проведении мероприятий с препаратом ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с инсектоакарицидными средствами. Обработку животных необходимо проводить в спецодежде (халат, головной убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки). Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки их следует немедленно промыть большим количеством чистой воды. При появлении признаков отравления (головокружение, общая слабость, тошнота) нужно прекратить работу, снять спецодежду, вымыть лицо, руки и обратиться в медицинское учреждение (при себе должна быть инструкция по применению лекарственного препарата или этикетка). Запрещается использовать пустую упаковку из-под лекарственного препарата в бытовых целях, она подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

14. Обработку препаратом ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия самок в период беременности и вскармливания приплода при необходимости проводят под контролем ветеринарного врача, на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения. Не следует применять препарат телятам в подсосный период.

15. Перед применением суспензию следует тщательно взболтать.

Обработку крупного рогатого скота проводят по показаниям, путем нанесения препарата с помощью дозирующего устройства на сухую и неповрежденную кожу спины от холки до крестца вдоль позвоночника однократно в дозах, указанных в таблице.

Таблица

Показания	Масса тела животного	Доза препарата
кровососущие двукрылые насекомые	до 100 кг	10 мл
	100-300 кг	20 мл
	свыше 300 кг	30 мл
вши (сифункулятоз)	до 500 кг	10 мл
	свыше 500 кг	20 мл
хориоптоз, псороптоз, саркоптоз	15 мл/100 кг, но не более 75 мл	
иксодовые клещи	15 мл/100 кг, но не более 75 мл	
вольфартиоз	10 мл/100 кг, но не более 75 мл	

Защитное действие после однократной обработки крупного рогатого скота препаратом ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия в зависимости от численности эктопаразитов и погодных условий продолжается против иксодовых клещей 4–5 недель, против насекомых – 8–10 недель.

Обработку животных против хориоптоза, псороптоза и саркоптоза проводят двукратно с интервалом 10 дней. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия обеспечивает защиту от саркоптоидных клещей (*Chorioptes bovis*, *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*) в течение 4 недель.

Повторные обработки животных проводят по показаниям.

При обработке ран, царапин и слизистых оболочек с личинками вольфартовой мухи (*Wohlfahrtia magnifica*), препарат наносят путем аппликации на пораженные участки тела предварительно пропитанными салфетками или тампонами с нормой расхода – 0,2 мл на 1 см² обрабатываемой поверхности.

Перед массовыми обработками каждую серию препарата испытывают на 10-15 животных разной упитанности. Если в течение двух суток после обработки животные не проявляют признаков гиперчувствительности к компонентам препарата, проводится обработка всего поголовья. Лактирующее поголовье обрабатывают сразу после доения.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях у высокопродуктивных пород крупного рогатого скота после нанесения препарата возможны индивидуальные реакции гиперчувствительности (возбужденное состояние, мотание головой, закидывание хвоста на спину), которые исчезают через 1-2 суток. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций препарат смывают водой и животному при необходимости назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При значительной передозировке препарата у животного может наблюдаться непродолжительное угнетенное состояние и снижение аппетита.

18. ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия запрещается применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами из-за возможного взаимного повышения токсичности. Информация о несовместимости с препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемого интервала между обработками, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

21. После обработки животных препаратом ДЕЛЬЦИД® 7,5 суспензия в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать продукты убоя крупного рогатого скота без ограничений. Молоко крупного рогатого скота разрешается использовать без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11. Телефон горячей линии: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор



С.В. Енгашев