

Заместитель председателя
СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК

Кабдулганов Т.А.

«21» 09

2017 г.



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
ООО НПО «Апи-Сан»

О.М. Бардадым

2017 г.



Наставление (инструкция)

по применению (использованию) ветеринарного препарата
Стоп-кокцид® 2,5% (раствор для орального применения)

Глава 1. Общие положения

1. Торговое наименование препарата: Стоп-кокцид® 2,5% (Stop-coccid 2,5%).
2. Международное непатентованное наименование: толтразурил.
3. Лекарственная форма: раствор для орального применения.
4. Стоп-кокцид® 2,5% в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 25 мг толтразурила, а также вспомогательные вещества: триэтаноламин и макрогол 400.
5. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость желтого цвета. Срок годности при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства. После вскрытия – не более 60 суток.
6. Запрещается применение Стоп-кокцида® 2,5% по истечении срока годности.
7. Стоп-кокцид® 2,5% расфасовывают по 10, 100 мл, 1 л в полимерные флаконы и по 5 л в полимерные канистры с навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы объемом менее 1 л помещают в картонную пачку. На каждый флакон по 10 и 100 мл наклеивают этикетку с указанием: наименования организации-производителя, торгового и международного непатентованного наименований и лекарственной формы препарата, наименования и содержания действующего вещества, способа применения, объема препарата во флаконе, даты производства (последние 4 цифры номера серии соответствуют дате производства), срока годности, годен до (месяц, год), номера серии, условий хранения, надписи «Для ветеринарного применения». На потребительскую упаковку препарата по 1 и 5 л наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса, торгового и международного

непатентованного наименования, лекарственной формы препарата, наименования и содержания действующего вещества, способа применения, объема препарата во флаконе, номера серии, годен до (месяц, год), даты производства (последние 4 цифры номера серии соответствуют дате производства), срока годности, номера регистрационного удостоверения, условий отпуска, условий хранения, предупредительных надписей: «Хранить в местах, недоступных для детей!», «Не применять по истечении срока годности!», «Перед применением ознакомиться с инструкцией!», надписи «Для ветеринарного применения», обозначения стандарта, знака соответствия и штрихового кода.

8. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2°C до 25°C.

9. Стоп-кокцид® 2,5% следует хранить в местах, недоступных для детей.

10. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

11. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Глава 2. Порядок применения

1. Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Стоп-кокцид® 2,5% не следует применять племенной птице, ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, курам-несушкам, ввиду накопления препарата в яйцах.

Не рекомендуется применение препарата одновременно с другими антикокцидийными препаратами.

При работе с препаратом Стоп-кокцид® 2,5% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. Пустые флаконы и канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПИ-САН»

следует избегать прямого контакта с Стоп-кокцидом® 2,5%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

2. Стоп-кокцид® 2,5% применяют птице с водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг массы птицы (28 мл препарата на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:

- 1 мл препарата на 1 л воды для поения. Полученный лечебный раствор выпаивают птице в течение 48 часов подряд или
- 3 мл препарата на 1 л воды для поения, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания курс лечения повторяют через 5 дней.

В период применения препарата птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

Лечебный раствор сохраняет свое действие в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата следует возобновить в той же дозировке и по той же схеме.

3. Стоп-кокцид® 2,5% применяют цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам, гусям и уткам с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе при достижении в подстилке критического уровня кокцидий (10 – 20 тыс./г), а также при появлении у птиц клинических признаков заболевания.

4. Особые условия содержания и ухода за птицей после применения препарата не требуются.

5. При применении Стоп-кокцида® 2,5% в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

6. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток, индеек, гусей и уток – не ранее чем через 16 суток после последнего применения Стоп-кокцида® 2,5%. В случае вынужденного убоя птиц ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПИ-САН»

7. В соответствии с инструкцией по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности применение Стоп-кокцида® 2,5% регистрируют в журнале для записей противоэпизоотических мероприятий соответствующей формы. Ветеринарную отчетность представляют по единым утвержденным формам в сроки, предусмотренные соответствующей формой отчета.

8. Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4. При установлении нежелательной реакции на ветеринарный препарат или установлении его неэффективности выясняют возможные причины их возникновения. При подтверждении несоответствия препарата показателям качества составляют акт соответствующей формы и сообщают об этом в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Совместно с рекламацией направляют 2-3 флакона с некачественным препаратом.

Наставление разработано: компанией ООО «АПИ-САН» 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Арцимовича д.3, корп.1, кв. 222, тел. +7 (495) 580-7713, info@api-san.ru

Рекомендовано к регистрации в Республике Казахстан КВКиН МСХ РК.