

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Белкаролин»
Т.П. Ващенко
«Белкаролин» 2022 г.

Инструкция по применению средства для обработки вымени «Грин Лайн Дип»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство для обработки вымени «Грин Лайн Дип» (далее – средство) представляет собой эмульсию от малиново-красного до тёмно-бордового цвета. Допускается расслоение при хранении, которое быстро исчезает при встряхивании.

1.2 В состав средства входят: экстракт Алоэ вера, молочная кислота, пленкообразователь, краситель, растворитель.

1.3 Средство фасуют в полимерную тару по 100 см³, 500 см³, 1000 см³.

1.4 Средство хранят в упаковке производителя, в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С. Срок годности – два года от даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

1.5 После вскрытия упаковки средство хранить герметично укупоренным. Огнеопасно! Не использовать и не хранить вблизи источников пламени, искр и нагреваемых поверхностей.

1.6 Хранить в недоступном для детей месте.

2. СВОЙСТВА

2.1 Средство для обработки вымени обеспечивает физический и химический барьер, защищающий соски от проникновения микроорганизмов из окружающей среды в период до 7 дней после запуска, и способствует формированию естественной кератиновой пробки.

2.2 Средство используется в дополнение к антибактериальной терапии в процедуре запуска коров в сухостойный период.

2.3 Молочная кислота обеспечивает дополнительный барьер против микроорганизмов, вызывающих мастит; предотвращает обезвоживание клеток.

2.4 Экстракт Алоэ увлажняет и смягчает кожу соска, ускоряет регенерацию клеток.

2.5 Средство высыхает в течение 3-5 минут, устойчиво к воздействию воды, навоза и мочи.

2.6 Средство плотно прилегает к неровностям снаружи, проникает в канал соска, высыхает и надежно закупоривает сфинктер.

2.7 Средство нерастворимо в молоке, поэтому предотвращает протекание молока из соска при растрескивании кончика соска или перед отелом.

2.8 Средство может быть использовано для нетелей (у них соски начинают раскрываться за две недели до отела), особенно в районах с высокой популяцией мух.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Средство применяется для профилактики мастита у сухостойных коров и нетелей, а также в комплексной терапии мастита в сухостойный период у коров совместно с местными антимикробными препаратами.

3.2 Средство предназначено для обработки сосков вымени: в сухостойный период у коров и за 10 дней до отёла у нетелей, с целью предотвращения проникновения патогенной микрофлоры в вымя через сосковый канал, а также предотвращения появления трещин и микротравм на сосках.

3.3 Средство готово к применению и не требует разведения. Перед применением встряхнуть.

3.4 Перед окунанием необходимо обработать сосок спиртовой салфеткой, затем высушить.

3.5 Обработку животного производят методом погружения соска вымени в стаканчик со средством на несколько секунд. Рекомендуется полностью погружать соски в средство для увеличения срока нахождения пленки на соске, а также выдерживать стаканчик со средством несколько секунд под соском для сбора излишков средства.

У коров необходимо проводить несколько обработок во время запуска и во время сухостойного периода:

- первая обработка проводится в день запуска;
- вторая - за 7-10 дней до отёла;
- третья - за 3-5 дней до отёла.

У нетелей:

- за 10 дней до предполагаемой даты отёла.

После нанесения средства на соски следует удерживать животное до полного высыхания средства. Стойкая эластичная защитная пленка образуется в течение 3-5 минут и закупоривает сосковый канал на период до 7 дней. Для усиления защиты соска допускается повторная обработка соска после полного высыхания первого покрытия.

Средство хорошо видно на сосках, что позволяет контролировать обработку животных.

Рекомендуется ежедневно осматривать соски на предмет целостности укупорки соскового канала средством и проводить повторную обработку в случае ее нарушения.

3.6 Рекомендуется совместное применение с интрацистернальными препаратами при запуске.

3.7 Перед доением следует тщательно удалить остатки средства с сосков.

3.8 Запрещается сливать использованное средство обратно в тару.

4. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе со средством следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

4.2 Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

4.3 В случае контакта средства со слизистой оболочкой глаз необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды.

4.4 При случайном проглатывании необходимо промыть желудок, обратиться к врачу.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

В случае несоответствия средства требованиям нормативных документов, применение прекращают, невскрытую единицу средства этой серии отправляют ООО «Белкаролин» по адресу: Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/31.