

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Септо-спрей для лечения заболеваний кожи, слизистых оболочек и обработки операционного поля у животных

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата Септо-спрей (Septo-Spray).

Международное непатентованное наименование: повидон-йод.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Септо-спрей в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: йодоповидон – 30 мг (3 мг активного йода), в качестве вспомогательных веществ: глицерин, кислоту лимонную моногидрат, натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный и воду очищенную до 1 мл.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную слегка вязкую жидкость коричневого цвета со слабым запахом йода.

Срок годности препарата Септо-спрей при соблюдении условий хранения – 18 месяцев со дня производства, после вскрытия флакона (бутылки) – 60 суток. Запрещается применение препарата Септо-спрей по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат Септо-спрей расфасованным по 100 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, закупоренные навинчиваемыми крышками, с насадками-спреерами или распылителями. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Препарат Септо-спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Препарат Септо-спрей отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Препарат Септо-спрей относится к антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим лекарственным препаратам.

10. При контакте препарата Септо-спрей с кожей и слизистыми оболочками происходит постепенное разрушение комплекса йодоповидона с высвобождением активного йода, который оказывает выраженное противомикробное действие, окисляя активные группы белков протоплазмы бактерий, а также вызывает денатурацию белков.

Йод активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших), резистентность к нему отсутствует.

При нанесении препарата Септо-спрей на кожу происходит временное слабое окрашивание ее в светло-желтый цвет.

Препарат Септо-спрей по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Препарат Септо-спрей применяют для лечения заболеваний кожи, слизистых оболочек и обработки операционного поля у животных.

12. Противопоказания для применения – индивидуальная повышенная чувствительность к йодсодержащим препаратам.

13. Препарат Септо-спрей применяют наружно, нанося его на поражённые участки путём распыления с расстояния 10-20 см от поверхности до ее визуального покрытия лекарственным препаратом.

При лечении асептических и инфицированных ран, ожогов 1 и 2 степени, экзем и дерматитов препарат Септо-спрей наносят 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней. При необходимости перед нанесением препарата проводят туалет раны.

Лечение слизистых оболочек ротовой полости и глотки проводят путем распыления 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней. Перед распылением рекомендуется промыть слизистые оболочки теплой кипяченой водой.

Нельзя поить и кормить животное в течение 30 минут после обработки препаратом Септо-спрей.

Обработку операционного и инъекционного поля проводят путем распыления с расстояния 10-20 см до визуального покрытия подготовленного участка поля. Обработку проводят дважды, дав обработанной поверхности подсохнуть.

14. При применении препарата согласно инструкции симптомов передозировки не установлено. В случае передозировки животному необходимо назначить симптоматическую терапию.

15. Особенности действия препарата при первом применении или его отмене не выявлено.

16. Разрешено применять лекарственный препарат лактирующим, беременным животным и молодняку.

17. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата Септо-спрей возобновляют в той же дозировке и схеме применения.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

19. Препарат Септо-спрей не используют совместно с другими антисептическими и дезинфицирующими препаратами для наружного применения.

20. Продукцию животноводства во время и после применения препарата Септо-спрей используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Септо-спрей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Септо-спрей. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы и бутылки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-1.14-3243№ПВР-3-6.8/02278

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ

ООО "НИТА-ФАРМ", Россия, 410010 г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

тел./факс: +7(8452) 338-600.

client@nita-farm.ru www.nita-farm.ru